

Potencial Evocado Visual de VARREDURA – Adulto e Criança cooperante

Outras nomenclaturas: PE Visual de Varredura, PEV-PR potencial evocado visual por padrão varredura.

Descrição

Potencial Evocado Visual de Varredura é um exame destinado à avaliação da acuidade visual. Durante o procedimento, o paciente é exposto a estímulos visuais onde deve permanecer fixando o olhar no centro do monitor durante todo o procedimento. Por análise de regressão logarítima é estimada a acuidade visual, e, posteriormente, tais potenciais evocados visuais são analisados por um médico especialista.

A principal indicação é avaliação da acuidade visual objetiva em paciente que não cooperam para tal certificação, além de casos de perícia médica.

Orientações Gerais

- Caso possua **exames prévios relacionados ao diagnóstico**, o paciente e/ou responsável deve **trazer no dia do exame**. Recomenda-se que o paciente **traga o seu ÓCULOS E/OU LENTE DE CONTATO**, leve todos os exames oftalmológicos e neurológicos.
- **O cabelo do paciente deve estar higienizado e seco**, sem uso de cremes, gel, pomada de cabelo ou produtos semelhantes.
- O exame é indolor; no entanto, o **paciente precisa ser cooperante e manter a fixação ocular no monitor durante todo o procedimento**. Os olhos do paciente são estimulados tanto individualmente, sendo o olho não estimulado tapado com um tampão, quanto simultaneamente. Normalmente, **crianças menores de 6 anos**, ou **pacientes não colaborativos, não conseguem manter a fixação no monitor para realização deste exame** na técnica padronizada.

Preparo

Pacientes **precisam ser cooperantes**, trazer suas lentes corretivas, óculos e/ou lentes de contato.

Laudo

O laudo será disponibilizado no nosso site dentro no prazo oficial de **até 7 dias úteis**, podendo, em alguns casos, ser antecipado para até 15 minutos após a realização do exame, dependendo da disponibilidade na agenda.

Jejum

Não é necessário jejum.

Duração

O exame tem duração aproximada de 1 hora. Realizado em vigília.

Medicações

O paciente deve manter suas medicações de uso contínuo. Alterações devem ser feitas somente mediante orientação do médico solicitante.